

PENERAPAN STIMULASI ORAL PADA BAYI PREMATUR UNTUK PENINGKATAN FUNGSI ORAL MOTOR

Silfiana Nur Amalia, Alinda Nur Ramadhani

silfiananaa@gmail.com

Universitas 'Aisyiyah Surakarta

INTISARI

Latar Belakang : Persalinan prematur merupakan persalinan terlalu dini yang mana terjadi pada usia kehamilan lebih dari 20 minggu dan sebelum 37 minggu. Sejalan dengan itu bayi prematur merupakan bayi yang lahir hidup sebelum usia gestasi 37 minggu dan biasanya diikuti dengan berat badan kurang dari 2500 gram pada saat lahir. Hal ini perlu adanya atensi khusus untuk penanganan, karena kondisi bayi prematur dapat menimbulkan beberapa permasalahan salah satunya gangguan pada oral motor. Permasalahan tersebut menjadi dasar dilakukannya intervensi dini untuk meningkatkan kemampuan pemberian makanan secara oral. Oleh karena itu, dapat dilakukan stimulasi oral dengan metode *Premature Infant Oral Motor Intervention* (PIOMI). PIOMI adalah protokol oral-motorik 5 menit yang dikelola oleh terapis.

Tujuan : Meningkatkan pengetahuan terutama bagi orang tua/keluarga bayi prematur, fisioterapi dan mahasiswa fisioterapi tentang bagaimana penatalaksanaan stimulasi oral pada bayi premature. **Metode :** Media KIE buku saku yang berjudul "Penerapan Oral Stimulasi Pada Bayi Prematur Untuk Peningkatan Fungsi Oral Motor".

Kesimpulan : Buku saku yang berjudul "Penerapan Oral Stimulasi Pada Bayi Prematur Untuk Peningkatan Fungsi Oral Motor" dipilih sebagai media edukasi dan promosi kesehatan dengan sasaran orang tua/keluarga pasien, praktisi fisioterapi dan mahasiswa fisioterapi.

Kata Kunci : Bayi Prematur, Oral Motor, Stimulasi Oral