

PERBEDAAN EFEKTIVITAS AIR REBUSAN DAUN BINAHONG DENGAN DAUN JAMBU BIJI TERHADAP LAMA PENYEMBUHAN LUKA PERINEUM DI BPM MOYANA S.ST

Selpia Rosa¹, Suparmi²
202322180.students@aiska-university.ac.id
suparmi@aiska-university.ac.id

Universitas 'Aisyiah Surakarta

ABSTRAK

Latar Belakang: Luka perineum adalah perlukaan yang terjadi pada saat persalinan di bagian perineum, perawatan penyembuhan luka perineum dapat menggunakan air rebusan daun binahong karena mengandung asam askorbat yang didalamnya terdapat kandungan vitamin c sehingga dapat mempercepat penyembuhan luka dan daun jambu biji mengandung steroid yang dapat mengurangi peradangan sehingga dapat mempercepat penyembuhan luka. **Tujuan:** untuk mengetahui perbedaan efektivitas air rebusan daun binahong dan daun jambu biji terhadap lama penyembuhan luka perineum pada ibu nifas di BPM Moyana. **Metode:** *quasi experiment* dengan rancangan *two group post test only design*. Pengambilan sampel menggunakan *non-probability sampling* berupa *purposive sampling*. Instrumen penelitian dengan lembar *ceklist* pada perawatan luka dan menggunakan *skala reeda* pada lamanya penyembuhan luka. **Hasil:** *uji statistic mann whitney* diperoleh nilai *p value* $0,397 > 0,05$, artinya tidak ada perbedaan efektivitas air rebusan daun binahong dengan daun jambu biji terhadap lama penyembuhan luka perineum. **Kesimpulan:** rata-rata lama penyembuhan luka perineum pada intervensi 1 yaitu 5,7 hari, dan rata-rata lama penyembuhan luka perineum pada intervensi 2 yaitu 6,0 hari. Daun binahong dan daun jambu biji memiliki efektivitas yang sama terhadap penyembuhan luka perineum.

Kata Kunci : Luka perineum, daun binahong, daun jambu biji
Daftar Pustaka : 21 (2015-2023)