

GAMBARAN KARAKTERISTIK DAN EFEK SAMPING PENGOBATAN ARV PADA ANAK DENGAN HIV/AIDS (ADHA) DI YAYASAN LENTERA SURAKARTA

Muhammad Rifal Wisnu Hidayat

Ipangrembol1999@gmail.com

STIKES 'Aisyiyah Surakarta

ABSTRAK

Latar Belakang; Jumlah kumulatif infeksi HIV meningkat setiap tahunnya termasuk pada anak-anak. Kadar CD4 dan kekebalan tubuh anak dengan HIV/AIDS dapat dipertahankan dengan mengkonsumsi obat anti retroviral (ARV). ARV bagi penderita HIV/AIDS juga memberikan berbagai efek samping **Tujuan;** Mengetahui gambaran karakteristik dan efek samping pengobatan ARV pada anak dengan HIV/AIDS (ADHA) di Yayasan Lentera Surakarta. **Metode;** jenis penelitian ini adalah penelitian *diskriptif*. Sampel dalam penelitian ini adalah ADHA di Yayasan Lentera Surakarta yang berjumlah 32 anak. Teknik sampling menggunakan *purposive sampling*. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner karakteristik responden dan kuesioner efek samping ARV. Analisa data menggunakan distribusi frekuensi. **Hasil;** Umur pada anak-anak ADHA di Yayasan Lentera Surakarta sebagian besar memiliki umur 6-12 tahun, jenis kelamin laki-laki dan perempuan dengan jumlah yang sama, lama menderita HIV pada anak-anak ADHA lebih dari 5 tahun. Efek samping ARV pada anak-anak ADHA mayoritas tidak mengalami alergi, muntah, diare dan susah tidur. Mayoritas responden mengalami efek samping sakit kepala, dan mual. **Kesimpulan;** Efek samping ARV pada anak-anak ADHA mayoritas tidak mengalami alergi, muntah, diare dan susah tidur. Mayoritas responden mengalami efek samping sakit kepala, dan mual.

Kata Kunci: umur, jenis kelamin, efek samping,