

ABSTRAK

Dina Sofyana B2015036 Program Studi DIII Keperawatan STIKES 'Aisyiyah Surakarta	Dosen Pembimbing : 1. Anjar Nurrohmah, S. Kep., Ns., M. Kep. 2. Wahyu Purwaningsih, S. Kep., Ns., M. Sc
PENERAPAN MERUBAH POSISI DAN MASSASE KULIT PADA PASIEN STROKE TERHADAP TERJADINYA RISIKO DEKUBITUS DI RSUD KOTA SURAKARTA	
ABSTRAK	
<p>Latar Belakang; Prevalensi stroke di RSUD Kota Surakarta berjumlah 46 pasien yang menderita stroke hemoragik, dan 287 pasien yang menderita stroke non hemoragik. Dari data ini menunjukkan prevalensi stroke di RSUD Kota Surakarta lebih tinggi dari RS Panti Waluyo yaitu penderita stroke hemoragik berjumlah 106 pasien dan penderita stroke non hemoragik berjumlah 35 pasien. Pasien dengan stroke berisiko tinggi mengalami komplikasi medis serius yang disebabkan oleh tirah baring yang berkepanjangan dan imobilitas, yaitu dekubitus. Tindakan pencegahan yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi supaya dekubitus tidak terjadi adalah dengan melakukan penerapan merubah posisi setiap 2 jam sekali dan massase kulit 2 kali sehari dengan durasi 5-15 menit selama 6 hari berturut-turut. Tujuan; Mendiskripsikan hasil penerapan merubah posisi dan massase kulit pada pasien stroke terhadap terjadinya risiko dekubitus. Metode Penelitian; Menggunakan metode diskriptif dengan mengobservasi pada subyek penelitian. Pengukuran risiko dekubitus diukur dengan lembar observasi Skala Braden lalu dicatat sebelum dan sesudah penerapan merubah posisi dan massase kulit. Hasil; Risiko dekubitus sebelum dilakukan penerapan pada responden pertama, mengalami penurunan dari sedang ke ringan, sementara responden kedua, dari tinggi ke sedang. Kesimpulan; Terdapat penurunan risiko dekubitus sesudah penerapan merubah posisi dan massase kulit.</p>	
Kata Kunci : Stroke, Merubah Posisi, Massase Kulit, Risiko Dekubitus	