

HUBUNGAN FREKUENSI *COITUS* DENGAN PERSALINAN NORMAL DI RS ASY SYIFA SAMBI KABUPATEN BOYOLALI

Indarti¹ Sri Kustiyati²
indarti250588@gmail.com
Universitas 'Aisyiyah Surakarta

ABSTRAK

Latar Belakang; Keberhasilan proses persalinan secara normal dipengaruhi banyak factor diantaranya adalah frekuensi *coitus* selama kehamilan. *Coitus* atau hubungan suami istri dapat memperlancar peredaran darah area reproduksi termasuk serviks yang membantu pelunakan dan pembukaan serviks terutama jika sering dilakukan saat trimester ketiga kehamilan. *Coitus* juga dapat meningkatkan produksi hormone oxytocin yang dapat memicu kontraksi uterus dan membantu mempercepat proses persalinan normal. **Tujuan;** menganalisis hubungan frekuensi *coitus* dengan kejadian persalinan normal. **Metode;** Jenis penelitian *analitik* dengan rancangan korelasional dan pendekatan *cross sectional*. Sampel digunakan 84 orang dengan purposive sampling. Instrument menggunakan lembar observasi. Analisa data menggunakan *chi square*. **Hasil;** frekuensi *coitus* responden mayoritas kadang-kadang melakukan (1-2x dalam seminggu) (47,6%) dan mayoritas didominasi responden mengalami persalinan secara normal (84,5%). Hasil analisis *chi square* diperoleh nilai *chi square* sebesar 62,786 > *chi square* tabel (5,99) dengan nilai signifikan (*p value*) 0,000 < 0,05 sehingga dapat diartikan bahwa ada hubungan frekuensi *coitus* dengan kejadian persalinan normal. **Kesimpulan;** Ada hubungan frekuensi *coitus* dengan persalinan normal di RS. Asy Sifa Sambi Kabupaten Boyolali.

Kata Kunci : frekuensi *coitus*, persalinan normal