

**PENERAPAN ALIH BARING TERHADAP DERAJAT DEKUBITUS
PADA PASIEN STROKE DI RUANG ICU RSUD dr. SOEHADI
PRIJONEGORO SRAGEN**

Ima Nurjanah (2017)
Program Studi Diploma III Keperawatan
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan 'Aisyiyah Surakarta
Wahyu Purwaningsih, M. Sc, Norman Wijaya Gati, M. Kep., Sp. Kep. J

Kata Kunci : Alih Baring, Dekubitus, Stroke

ABSTRAK

Latar belakang : Seseorang yang menderita stroke akan mengalami gangguan mobilisasi. Akibat dari gangguan mobilisasi aktivitas dan pergerakan seseorang akan terbatas. Dampak dari terbatasnya pergerakan yaitu dekubitus, dimana terjadi penekanan kulit pada area menonjol dengan permukaan tempat tidur yang dapat membuat seseorang merasa tidak nyaman dan merasakan sakit. Pencegahan dari dekubitus yaitu dilakukan alih baring, sehingga suplai makanan tidak sampai ke kulit yang mengalami penekanan. Alih baring juga dapat mengurangi gesekan dan tekanan. **Tujuan** : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh alih baring terhadap kejadian dekubitus pada pasien stroke. **Metode** : Desain penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus, dilakukan pada satu subjek penelitian. **Hasil** : Sebelum dilakukan penerapan alih baring terjadi dekubitus derajat I pada kulit daerah sacrum, setelah pemberian alih baring setiap 2 jam selama 6 hari tidak terjadi dekubitus. **Kesimpulan**: Ada pengaruh alih baring terhadap derajat dekubitus pada pasien stroke.