

Nika Indriyani

Dosen Pembimbing :

NIM C2013086

1. Anjar Nurrohmah, S.Kep, Ns., M.Kep.

Program Studi Ilmu Keperawatan

2. Annisa Andriyani, S.Si.T., M.P.H

**HUBUNGAN MENYENDAWAKAN BAYI SETELAH MENYUSUI
DENGAN KEJADIAN REGURGITASI PADA BAYI USIA 0-6 DI
WILAYAH KERJA PUSKESMAS MAJEGAN KABUPATEN KLATEN**

ABSTRAK

Latar Belakang; Menyusui atau memberikan ASI eksklusif pada bayi usia 0-6 bulan sangatlah penting dilakukan oleh ibu. ASI memiliki banyak manfaat, akan tetapi ASI juga menimbulkan dampak yang terjadi pada bayi salah satunya yaitu kejadian regurgitasi. Hampir semua bayi usia 0-6 bulan pernah mengalami regurgitasi. Adapun cara mencegah regurgitasi yaitu dengan cara menyendawakan bayi setelah menyusui. **Tujuan;** Menganalisis hubungan menyendawakan bayi setelah menyusui dengan kejadian regurgitasi pada bayi usia 0-6 bulan di wilayah kerja Puskesmas Majegan Kabupaten Klaten. **Metode;** Penelitian analitik dengan rancangan *Case Control* menggunakan teknik *Cluster Sampling* dengan jumlah penelitian 56 ibu bayi, sedangkan instrumen penelitian menggunakan lembar observasi. Analisa bivariat menggunakan uji *Chi Square*. **Hasil;** Hasil uji bivariat membuktikan bahwa sebagian besar bayi usia 0-6 bulan sering disendawakan sebanyak 36 (64,3%) responden, dan kejadian regurgitasi sebagian besar dengan kategori jarang sebanyak 40 (71,4%) responden. Terdapat hubungan menyendawakan bayi dengan kejadian regurgitasi di Puskesmas Majegan Kabupaten Klaten. Hasil analisis diperoleh nilai χ^2 hitung (15.058) > χ^2 tabel (3.841) dan nilai ρ value= 0.000 < 0.05. **Kesimpulan;** Ada hubungan menyendawakan bayi setelah menyusui dengan kejadian regurgitasi pada bayi usia 0-6 bulan di wilayah kerja puskesmas Majegan Kabupaten Klaten.

Kata Kunci : *menyendawakan bayi, kejadian regurgitasi*