

# **PENERAPAN PIJAT OKSITOSIN TERHADAP INVOLUSI UTERUS PADA IBU POST PARTUM DI PUSKESMAS CEPOGO**

Dina Irnawati, Mulyaningsih, Irma Mustika Sari

[dinairnawati@gmail.com](mailto:dinairnawati@gmail.com)

Program Studi Keperawatan STIKES' AISYIYAH Surakarta

## **ABSTRAK**

**Latar Belakang:** Perdarahan pada ibu post partum dapat terjadi akibat kontraksi uterus yang kurang baik dan uterus yang lembek, Salah satu cara untuk penanganan perdarahan pada ibu post partum agar kontraksi uterus tetap baik dengan pijat oksitosin karena upaya untuk mempertahankan kontraksi uterus melalui pijat oksitosin yang menjadi bagian penting perawatan ibu post partum. **Tujuan:** Mengetahui hasil penerapan pijat oksitosin terhadap involusi uterus pada ibu post partum di puskesmas cepogo **Metode:** Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus. **Hasil:** Involusi uterus sebelum dilakukan penerapan pijat oksitosin pada Ny.F berukuran 14 cm sedangkan pada Ny. S berukuran 12 cm, involusi uterus setelah dilakukan penerapan pijat oksitosin pada Ny. F berukuran 9 cm sedangkan pada Ny. S setelah dilakukan penerapan pijat oksitosin menjadi 8 cm, perkembangan involusi uterus pada hari pertama sebelum dilakukan pijat oksitosin berukuran 14 cm dan pada hari kelima setelah dipijat oksitosin menjadi 9 cm pada Ny. F sedangkan pada hari pertama sebelum dilakukan pijat oksitosin berukuran 12 cm setelah dilakukan pijat oksitosin pada hari kelima berukuran 8 cm pada Ny. S **Kesimpulan:** Terdapat perbedaan involusi uterus sebelum dan setelah dilakukan pijat oksitosin pada responden pertama 14 cm menjadi 9 cm dan pada responden kedua dari 12 cm menjadi 8 cm.

**Kata kunci :** Pijat oksitosin, involusi uterus, post partum